



PASOS A SEGUIR DESPUES DE LA BIOPSIA DE PROSTATA

La siguiente información es una guía de cómo debe cuidarse después de una biopsia transrectal de la glándula de la próstata. Hay tres (3) condiciones en particular en las cuales usted debe estar pendiente. Si alguna de estas ocurre, llame a la oficina inmediatamente al (908) 654-5100 or (201) 997-0640.

1. Desangramiento excesivo rectal o de la vejiga.
 2. Temperatura sobre 101 grados o escalofríos.
 3. Inabilidad para orinar.
1. No se alarme si ve un poco de sangre en su orina o cuando tenga una eyacuación. Esto es normal. La sangre en su orina estará presente por 1 o 2 días y la sangre cuando eyacule durará más o menos por 6 semanas.

Usted deberá contactar la oficina inmediatamente si el sangramiento rectal es excesivo o si se prolonga, o si pasa coágulos de sangre de su recto o uretra.

2. Si tiene temperatura más alta del 101 grados o escalofríos, contacte la oficina inmediatamente.
3. Si después de varias horas, no ha podido orinar por favor contacte la oficina inmediatamente.

Se le ha dado un antibiótico o una prescripción para antibióticos, por favor siga las instrucciones como debe tomarlos. También, si usted toma **ASPIRINA, ASPIRINA BEBE'** diariamente, debe dejar de tomarlas 5 días antes de la biopsia.

NOTA: Como precaución por favor no conduzca aparatos para cortar la grama o para limpiar la nieve por 5 días después de la biopsia.

Los resultados de la biopsia no estarán listos por lo menos una semana después de la biopsia. Por favor haga una cita de 7 a 10 días después de la biopsia para discutir los resultados con el doctor. **Los resultados de la biopsia no se dan por teléfono.**

Por favor sepa que recibirá una factura del laboratorio de patología por preparación de las pruebas. Usted será responsable por este pago. Su seguro puede cubrir porciones de estos cargos.

*Adult and Pediatric Urology • Sexual Dysfunction • Male Infertility • Urinary Incontinence • Urologic Oncology
Laparoscopic Surgery • Robotic Surgery • Radiation Oncology • Stone Disease Management • Pelvic Reconstruction*

275 Orchard Street • Westfield, New Jersey 07090 • Tel: (908) 654-5100 • Fax: (908) 789-8755
659 Kearny Avenue • Kearny, New Jersey 07032 • Tel: (201) 997-0640 • Fax: (908) 789-8755
776 East Third Avenue • Roselle, New Jersey 07203 • Tel: (908) 241-5268 • Fax: (908) 789-8755
Atkins Medical Plaza • 1500 Pleasant Valley Way • Suite 306 • West Orange, New Jersey 07052 • Tel: (973) 325-0091 • Fax: (908) 789-8755
570 South Avenue East • Building A • Cranford, New Jersey 07016 • Tel: (908) 272-5335 • Fax: (908) 497-1633